

ПАРАЦЕТАМОЛ ПАНФАРМА, 10 mg/ml
инфузионен разтвор
(лого)

За краткотрайно лечение на умерена болка, особено след хирургическа интервенция, и за краткотрайно лечение на повишена температура, когато интравенозното приложение е клинично оправдано поради спешна необходимост за лечение на болка или хипертермия и/или когато другите пътища за въвеждане не са възможни.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, КОГАТО ПРЕДПИСВАТЕ И ПРИЛАГАТЕ ПАРАЦЕТАМОЛ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ГРЕШКИТЕ ПРИ ДОЗИРАНЕ ПОРАДИ ОБЪРКВАНЕ МЕЖДУ МИЛИГРАМИ (MG) И МИЛИЛИТРИ (ML), ТЪЙ КАТО В РЕЗУЛТАТ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ФАТАЛНИ ДОЗИ

Когато пишете рецепта, е препоръчително да отбележите както общата доза в mg, така и съответния обем в ml. Обърнете внимание дали дозата се прилага съобразно специалните препоръки за педиатрична група (вижте препоръките най-долу на страницата)

Процедура за приложение при новородени бебета, бебета и деца с тегло под 10 kg ⁽¹⁾

1 ml = 10 mg

Тегло на пациента	Индивидуална доза	Максимална дневна доза **
≤ 10 kg *	7,5 mg/kg или 0,75 ml/kg	<ul style="list-style-type: none">• Да не се прилагат повече от 4 дози в рамките на период от 24 часа.• Минималният интервал между две отделни приложения трябва да бъде 4 часа.• Максималната дневна доза не трябва да превишава 30 mg/kg.
* Преждевременно родени бебета: няма налични данни за ефикасност и поносимост за преждевременно родени бебета		
** Максимална дневна доза: максималната дневна доза, описана в таблицата по-горе, е за пациенти, които не приемат други парацетамол-съдържащи лекарствени продукти, и трябва да се коригира съответно, като се вземат предвид такива продукти		

Обемът парацетамол 10mg/ml, прилаган при пациенти с тегло ≤ 10 kg, не трябва никога да надвишава 7,5 ml на доза.

Тегло на детето ≤ 10 kg	Обем, който трябва да се приложи	Съответно количество в mg
1 kg	0,75 ml	7,5 mg
1,5 kg	1,1 ml	11 mg
2 kg	1,5 ml	15 mg
2,5 kg	1,8 ml	18 mg
3 kg	2,2 ml	22 mg
3,5 kg	2,6 ml	26 mg
4 kg	3,0 ml	30 mg

4,5 kg	3,3 ml	33 mg
5 kg	3,7 ml	37 mg
5,5 kg	4,1 ml	41 mg
6 kg	4,5 ml	45 mg
6,5 kg	4,8 ml	48 mg
7 kg	5,2 ml	52 mg
7,5 kg	5,6 ml	56 mg
8 kg	6,0 ml	60 mg
8,5 kg	6,3 ml	63 mg
9 kg	6,7 ml	67 mg
9,5 kg	7,1 ml	71 mg
10 kg	7,5 ml	75 mg

Следните препоръки се прилагат при деца с тегло ≤ 10 kg

- **Не използвайте директно сакът в инфузия.**
- **Спринцовка с обем от 5 или 10 ml трябва да се използва за измерване на правилната доза въз основа на теглото на детето и търсения обем.**
- **Обемът, който трябва да се приложи, се изтегля от сака и се разтваря в 0,9% разтвор на натриев хлорид или 5% разтвор на глюкоза до една десета (в обемно съотношение 1 единица парацетамол Панфарма към 9 единици разредител) и се прилага в продължение на 15 минути.**