

ПАРАЦЕТАМОЛ ПАНФАРМА

10 mg/ml инфузионен разтвор

Интервалът между две отделни приложения трябва да бъде най-малко 4 часа.

Интервалът между две отделни приложения при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност трябва да бъде най-малко 6 часа.

Да не се прилагат повече от 4 отделни дози в рамките на период от 24 часа.

Тегло на пациента (kg)	Обем (ml)	Количество (mg)
1	0,75	7,5
2	1,5	15
3	2,2	22
4	3,0	30
5	3,7	37
6	4,5	45
7	5,2	52
8	6,0	60
9	6,7	67
10	7,5	75
11	16,5	165
12	18,0	180
13	19,5	195
14	21,0	210
15	22,5	225
16	24,0	240
17	25,5	255
18	27,0	270
19	28,5	285
20	30,0	300
21	31,5	315
22	33,0	330
23	34,5	345
24	36,0	360
25	37,5	375
26	39,0	390
27	40,5	405
28	42,0	420
29	43,5	435
30	45,0	450
31	46,5	465
32	48,0	480
33	49,5	495
34	51,0	510
35	52,5	525
36	54,0	540
37	55,5	555
38	57,0	570

39	58,5	585
40	60,0	600
41	61,5	615
42	63,0	630
43	64,5	645
44	66,0	660
45	67,5	675
46	69,0	690
47	70,5	705
48	72,0	720
49	73,5	735
50	75,0	750

За краткотрайно лечение на умерена болка, особено след хирургическа интервенция и за краткотрайно лечение на повишена температура, когато интравенозното приложение е клинично оправдано поради спешна необходимост за лечение на болка или хипертермия и/или когато другите пътища за въвеждане не са възможни ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Кратка характеристика на продукта