

Paracetamol Panpharma, 10 mg/ml

infusionsvätska, lösning

GROUPE



PANPHARMA

ROTEXMEDICA GmbH

PANPHARMA S.A.

För korttidsbehandling av måttlig smärta särskilt efter kirurgi, och för korttidsbehandling av feber när intravenös tillförsel är kliniskt motiverad för att snabbt behandla smärta eller hypertermi, och/eller när andra administreringsvägar inte är möjliga.

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET VID FÖRSKRIVNING OCH ADMINISTRERING AV PARACETAMOL FÖR ATT UNDVIKA DOSERINGSFEL PÅ GRUND AV FÖRVÄXLING MELLAN MILLIGRAM (MG) OCH MILLILITER (ML)

SOM KAN RESULTERA I POTENTIELLT DÖDLIGA DOSER.

Vid förskrivning bör både den totala dosen i mg och motsvarande volym i ml anges. Var noga med att säkerställa att dosen administreras enligt de särskilda rekommendationerna för den pediatrika populationen (se rekommendationer längst ner på denna sida).

Rutin för administrering till **nyfödda spädbarn, spädbarn och barn som väger mindre än 10 kg** ⁽¹⁾
(Doseringar uttrycks i mg paracetamol/kg)

1 ml = 10 mg

Patientens	Individuell dos	Maximal dygnsdos**
≤ 10 kg*	7,5 mg/kg eller 0,75 ml/kg	<ul style="list-style-type: none">Högst 4 doser får ges under 24 timmar.Det måste gå minst 4 timmar mellan varje administreringstillfälle.Den maximala dygnsdosen ska inte överstiga 30 mg/kg.
* För tidigt födda spädbarn: Det finns inga data tillgängliga avseende effekt och tolerabilitet hos för tidigt födda spädbarn.		
** Maximal dygnsdos: Den maximala dygnsdosen som anges i ovanstående tabell gäller patienter som inte behandlas med något annat läkemedel som innehåller paracetamol och ska justeras så att sådan läkemedel tas med i beräkning.		

Volymen paracetamol 10 mg/ml som ges till patienter som väger ≤ 10 kg ska aldrig överstiga 7,5 ml per dos.

Barn som väger ≤ 10 kg	Volym som ska	Motsvarande mängd i mg
1 kg	0,75 ml	7,5 mg
1,5 kg	1,1 ml	11 mg
2 kg	1,5 ml	15 mg
2,5 kg	1,8 ml	18 mg
3 kg	2,2 ml	22 mg
3,5 kg	2,6 ml	26 mg
4 kg	3,0 ml	30 mg
4,5 kg	3,3 ml	33 mg
5 kg	3,7 ml	37 mg
5,5 kg	4,1 ml	41 mg
6 kg	4,5 ml	45 mg
6,5 kg	4,8 ml	48 mg
7 kg	5,2 ml	52 mg
7,5 kg	5,6 ml	56 mg
8 kg	6,0 ml	60 mg
8,5 kg	6,3 ml	63 mg
9 kg	6,7 ml	67 mg
9,5 kg	7,1 ml	71 mg
10 kg	7,5 ml	75 mg

Följande rekommendationer gäller barn som väger ≤ 10 kg:

- Häng inte påsen direkt till infusion.
- En 5 eller 10 ml spruta ska användas för att mäta upp den dos som är lämplig för barnets vikt och önskad volym.
- Den volym som ska ges ska dras upp ur påsen och spädas i en 0,9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning upp till en tiondel (en volym Paracetamol Panpharma i nio volymer spädningsvätska) och ges under 15 minuter.