



GROUPE

PANPHARMA

ROTEXMEDICA GmbH

PANPHARMA S.A.

Paracetamol Panpharma

10 mg/ml, infusionsvätska, lösning

Det måste vara ett uppehåll på minst 4 timmar mellan varje administreringstillfälle.

Hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion måste ett uppehåll på minst 6 timmar göras mellan varje administreringstillfälle.

Högst 4 doser får ges under 24 timmar-

																																kg - patientens vikt																								
50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							
75	73,5	72	70,5	69	67,5	66	64,5	63	61,5	60	58,5	57	55,5	54	52,5	51	49,5	48	46,5	45	43,5	42	40,5	39	37,5	36	34,5	33	31,5	30	28,5	27	25,5	24	22,5	21	19,5	18	16,5	15	14	12,5	11,5	10,5	9,5	8,5	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	0,75	ml - volym	
750	735	720	705	690	675	660	645	630	615	600	585	570	555	540	525	510	495	480	465	450	435	420	405	390	375	360	345	330	315	300	285	270	255	240	225	210	195	180	165	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	7,5	mg - mängd					

Korttidsbehandling av måttlig smärta, särskilt efter kirurgi och för korttidsbehandling av feber när intravenös tillförsel är kliniskt motiverad för att snabbt behandla smärta eller hypertermi och/eller när andra administreringsvägar inte är möjliga.⁽¹⁾

(1) Produktresumé

DRA UT