



GROUPE

PANPHARMA

ROTEXMEDICA GmbH

PANPHARMA S.A.

Paracetamol Panpharma

10 mg/ml, solution pour perfusion

L'intervalle entre deux administrations est de 4 heures au minimum.

L'intervalle entre deux administrations chez l'insuffisant rénal sévère est de 6 heures au minimum.

Ne pas administrer plus de 4 doses par 24 heures.

| | | | kg – Poids du patient | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|-----|-----------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| | | | ml – Volume | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 73,5 | 72 | 70,5 | 69 | 67,5 | 66 | 64,5 | 63 | 61,5 | 60 | 58,5 | 57 | 55,5 | 54 | 52,5 | 51 | 49,5 | 48 | 46,5 | 45 | 43,5 | 42 | 40,5 | 39 | 37,5 | 36 | 34,5 | 33 | 31,5 | 30 | 28,5 | 27 | 25,5 | 24 | 22,5 | 21 | 19,5 | 18 | 16,5 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| | | | mg – Quantité | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 735 | 720 | 705 | 690 | 675 | 660 | 645 | 630 | 615 | 600 | 585 | 570 | 555 | 540 | 525 | 510 | 495 | 480 | 465 | 450 | 435 | 420 | 405 | 390 | 375 | 360 | 345 | 330 | 315 | 300 | 285 | 270 | 255 | 240 | 225 | 210 | 195 | 180 | 165 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 37 | 30 | 22 | 15 | 7,5 |

Traitement de courte durée des douleurs d'intensité modérée, en particulier en période post-opératoire et dans le traitement de courte durée de la fièvre, lorsque la voie intraveineuse est cliniquement justifiée par l'urgence de traiter la douleur ou l'hyperthermie et/ou lorsque d'autres voies d'administration ne sont pas possibles.⁽¹⁾

(1) Résumé des Caractéristiques du Produit.

TIRER