



GRUPE

PANPHARMA

ROTEXMEDICA GmbH

PANPHARMA S.A.

Paracetamol Panpharma

10 mg/ml, infusjonsvæske, oppløsning

Intervallet mellom to administrasjoner må være minst 4 timer.

Intervallet mellom to administrasjoner til pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon må være minst 6 timer. Det må ikke gis mer enn 4 doser i løpet av en 24-timers periode.

																															kg - Pasientens vekt																										
50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1								
																															ml - Volum																										
75	73.5	72	70.5	69	67.5	66	64.5	63	61.5	60	58.5	57	55.5	54	52.5	51	49.5	48	46.5	45	43.5	42	40.5	39	37.5	36	34.5	33	31.5	30	28.5	27	25.5	24	22.5	21	19.5	18	16.5	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
																															mg - Mengde																										
750	735	720	705	690	675	660	645	630	615	600	585	570	555	540	525	510	495	480	465	450	435	420	405	390	375	360	345	330	315	300	285	270	255	240	225	210	195	180	165	150	140	130	120	110	100	90	80	70	60	50	40	30	20	15	10	7.5	

Til korttidsbehandling av moderate smerter, særlig etter kirurgi og til korttidsbehandling av feber når det er klinisk nødvendig med intravenøs administrasjon på grunn av et akutt behov for behandling av smerte eller hypertermi og/eller når andre administrasjonsveier ikke er mulige.⁽¹⁾

(1) Preparatomtale

TREKK