



GROUPE

**PANPHARMA**

ROTEXMEDICA GmbH

PANPHARMA S.A.

# Paracetamol Panpharma

## 10 mg/ml, solution pour perfusion

L'intervalle entre deux administrations est de 4 heures au minimum.

L'intervalle entre deux administrations chez l'insuffisant rénal sévère est de 6 heures au minimum.

Ne pas administrer plus de 4 doses par 24 heures.

		kg – Poids du patient	
50	33	49,5	49,5
49	32	48	48
48	31	46,5	46,5
47	30	45	45
46	29	43,5	43,5
45	28	42	42
44	27	40,5	40,5
43	26	39	39
42	25	37,5	37,5
41	24	36	36
40	23	34,5	34,5
39	22	33	33
38	21	31,5	31,5
37	20	30	30
36	19	28,5	28,5
35	18	27	27
34	17	25,5	25,5
33	16	24	24
32	15	22,5	22,5
31	14	21	21
30	13	19,5	19,5
29	12	18	18
28	11	16,5	16,5
27	10	15	15
26	9	14	14
25	8	13	13
24	7	12	12
23	6	11	11
22	5	10	10
21	4	9	9
20	3	8	8
19	2	7	7
18	1	6	6
17		5,5	5,5
16		5	5
15		4,5	4,5
14		4	4
13		3,5	3,5
12		3	3
11		2,5	2,5
10		2	2
9		1,5	1,5
8		1	1
7		0,75	0,75
6			
5			
4			
3			
2			
1			

  

		ml – Volume	
75	49,5	75	75
73,5	48	73,5	73,5
72	46,5	72	72
70,5	45	70,5	70,5
69	43,5	69	69
67,5	42	67,5	67,5
66	40,5	66	66
64,5	39	64,5	64,5
63	37,5	63	63
61,5	36	61,5	61,5
60	34,5	60	60
58,5	33	58,5	58,5
57	31,5	57	57
55,5	30	55,5	55,5
54	28,5	54	54
52,5	27	52,5	52,5
51	25,5	51	51
49,5	24	49,5	49,5
48	22,5	48	48
46,5	21	46,5	46,5
45	20	45	45
43,5	19	43,5	43,5
42	18	42	42
40,5	17	40,5	40,5
39	16	39	39
37,5	15	37,5	37,5
36	14	36	36
34,5	13	34,5	34,5
33	12	33	33
31,5	11	31,5	31,5
30	10	30	30
28,5	9	28,5	28,5
27	8	27	27
25,5	7	25,5	25,5
24	6	24	24
22,5	5,5	22,5	22,5
21	5	21	21
19,5	4,5	19,5	19,5
18	4	18	18
16,5	3,5	16,5	16,5
15	3	15	15
14	2,5	14	14
13	2	13	13
12	1,5	12	12
11	1	11	11
10	0,75	10	10
9		9	9
8		8	8
7		7	7
6		6	6
5,5		5,5	5,5
5		5	5
4,5		4,5	4,5
4		4	4
3,5		3,5	3,5
3		3	3
2,5		2,5	2,5
2		2	2
1,5		1,5	1,5
1		1	1
0,75		0,75	0,75

  

		mg – Quantité	
750	49,5	750	750
735	48	735	735
720	46,5	720	720
705	45	705	705
690	43,5	690	690
675	42	675	675
660	40,5	660	660
645	39	645	645
630	37,5	630	630
615	36	615	615
600	34,5	600	600
585	33	585	585
570	31,5	570	570
555	30	555	555
540	28,5	540	540
525	27	525	525
510	25,5	510	510
495	24	495	495
480	22,5	480	480
465	21	465	465
450	20	450	450
435	19	435	435
420	18	420	420
405	17	405	405
390	16	390	390
375	15	375	375
360	14	360	360
345	13	345	345
330	12	330	330
315	11	315	315
300	10	300	300
285	9	285	285
270	8	270	270
255	7,5	255	255
240	7	240	240
225	6,5	225	225
210	6	210	210
195	5,5	195	195
180	5	180	180
165	4,5	165	165
150	4	150	150
135	3,5	135	135
120	3	120	120
105	2,5	105	105
90	2	90	90
75	1,5	75	75
60	1	60	60
45	0,75	45	45
30		30	30
15		15	15
7,5		7,5	7,5

Traitement de courte durée des douleurs d'intensité modérée, en particulier en période post-opératoire et dans le traitement de courte durée de la fièvre, lorsque la voie intraveineuse est cliniquement justifiée par l'urgence de traiter la douleur ou l'hyperthermie et/ou lorsque d'autres voies d'administration ne sont pas possibles.<sup>(1)</sup>

(1) Résumé des Caractéristiques du Produit.

TIRER